

# Vaccinurile pentru câini Boehringer Ingelheim

# EURICAN DAPPi-Lmulti

Vaccinul polivalent cu 6 criterii de protecție



Eurican DAPPi-Lmulti liofilizat și suspensie pentru suspensie injectabilă. O doză de liofilizat conține:

Virusul bolii Carre, tulpina BA5, Adenovirusul canin de tip 2, tulpina DK13, Parvovirusul canin de tip 2, tulpina CAG2, Virusul Parainfluenței de tip 2, tulpina CGF 2004/75. O doză (1ml) de suspensie conține: Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Canicola tulpina 16070, Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Icterohaemorrhagiae tulpina 16069, Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Grippotyphosa tulpina Grippot Mal 1540. **INDICAȚII:** Imunizarea activă la câini, în vederea: prevenirii mortalității și a semnelor clinice cauzate de virusul bolii Carre (CDV); prevenirii mortalității și a semnelor clinice cauzate de virusul hepatitei infectioase canine (CAV); reducerii excreției virale pe durata bolii respiratorii cauzată de adenovirusul canin de tip 2 (CAV-2); prevenirii mortalității, semnelor clinice și a excreției virale cauzate de parvovirusul canin (CPV)\*; reducerii excreției virale cauzată de virusul parainfluenței canine de tip 2 (CpIV); prevenirii mortalității, semnelor clinice, infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate de Leptospira interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae serotip Icterohaemorrhagiae; prevenirii mortalității\*\* și a semnelor clinice, reducerea infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate de Leptospira interrogans serogrup Canicola serotip Canicola; prevenirii mortalității\*\* și reducerea semnelor clinice, infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate de Leptospira kirschneri serogrup Grippotyphosa serotip Grippotyphosa. Instalarea imunității: 2 săptămâni pentru toate tulpinile. Durata imunității: cel puțin un an după cea de a doua injecție a primei vaccinări, pentru toate tulpinile. Datele disponibile obținute la teste serologice și prin infecție de control, demonstrează că protecția împotriva virusului bolii Carre, al adenovirusului și parvovirusului\* durează cel puțin 2 ani după prima vaccinare anuală. Orice decizie cu privire la adaptarea programului de vaccinare al acestui produs medicinal veterinar trebuie făcută de la caz la caz, luând în considerare istoricul de vaccinare al câinelui și contextul epidemiologic. \*S-a demonstrat protecția împotriva parvovirozei canine de tip 2a, 2b și 2c prin infecție de control (tip 2 b) și serologic (tip 2a și 2c). \*\*Pe durata infecției de control pentru demonstrarea duratei imunității pentru Leptospira Canicola și Grippotyphosa nu s-a înregistrat nicio mortalitate. Citiți prospectul înainte de utilizare. Numai pentru uz veterinar - A se elibera numai pe bază de rețetă medicală veterinară. Deținătorul autorizației de comercializare: Merial - Lyon Franța. A.C. 150495. Importator VETECO Interservices S.R.L. - www.veteco.ro

www.bleupiment.fr - 09/2017



# DAPPI-Lmulti

## Avantaje majore, combinație unică

### 6 criterii de protecție

- **EURICAN DAPPI-Lmulti este primul vaccin polivalent la care componenta de Lepto asigură 6 nivele de protecție.**

Este deosebit prin nivelul de protecție împotriva serovarurilor țintă<sup>§</sup>

|                       | EURICAN DAPPI-Lmulti <sup>§</sup> | Competitor A <sup>§</sup> | Competitor B <sup>§</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mortalitate           | P **                              | -                         | -                         |
| Semne clinice         | P/R **                            | P **                      | -                         |
| Infecție/Leptospiemie | P/R **                            | P/R **                    | R **                      |
| Excreție bacteriană   | P/R **                            | P/R **                    | R **                      |
| Portaj renal          | P/R **                            | -                         | -                         |
| Leziuni renale        | P/R **                            | -                         | -                         |

§ Pentru serovarurile: Icterohaemorrhagiae, Caniocaola and Grippityphosa

Adaptat din Ref 1: Dosarul de înregistrare al Eurican DAPPI Lmulti - Adaptat din Ref 2 RCP Versican L4 și RCP Nobivac L4

P: Previne\*\* R: Reduce\*\*

- **PROTECȚIE ÎNCRUCIȘATĂ ÎMPOTRIVA CPV 2A, 2B ȘI 2C<sup>(1)</sup>**  
EURICAN DAPPI-Lmulti a demonstrat prezența anticorpilor cross-reactivi împotriva tulpinilor circulante de CPV 2a, 2b și 2c, oferind un răspuns imun puternic și de lungă durată.

#### Compatibil cu RABISIN<sup>(1)</sup>

- Eficacitatea nu este afectată în cazul administrării concomitente, dar obligatoriu în două locusuri diferite de inoculare, a vaccinului Rabisin cu Eurican.

#### 100% fără adjuvanți, conținut proteic redus

- Merial a perfecționat procesul de producție prin implementarea unor inovații patentate<sup>(2)</sup> care minimizează încărcătura proteică non-antigenică a componentei Lepto. Proteinele străine (în special Albumina Serică Bovină) sunt adesea asociate reacțiilor alergice.



Instalarea  
rapidă a  
imunității



2 săptămâni

Standarde  
înalte de  
protecție



EURICAN DAPPI-Lmulti este conceput astfel încât să ofere standarde ridicate de protecție împotriva tuturor serovarurilor țintă de leptospiră.

Referințe:

<sup>(1)</sup> EURICAN DAPPI-Lmulti Registration File.

<sup>(2)</sup> Carboulec NPY: Leptospirosis culture process. 2014; US patent 8642316

<sup>(3)</sup> Klaasen HLB, Adler B: Recent advances in canine leptospirosis: focus on vaccine development. Veterinary Medicine: Research and Reports, 2015; 6: 245-260

<sup>(4)</sup> Ohmori, K, et al.: IgE reactivity to vaccine components in dogs that developed immediate-type allergic reactions after vaccination. Veterinary immunology and immunopathology 2005; 104.3: 249-256